

CONCORSO PUBBLICO per titoli ed esami
per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato di OSTETRICA

Data espletamento: 11/03/2024

CRITERI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA

Per l'attribuzione dei punteggi è stato previsto il seguente meccanismo di calcolo:

- 1 punto per ogni risposta corretta
- 0 punti per ogni risposta errata
- 0 punti per ogni risposta omessa

La prova si intende superata con n. 21 risposte corrette.

Concorso pubblico per titoli ed esami
Ostetriche 2024

PROVA NUMERO 1


1. In corso di crisi vagale la paziente manifesterà:
 - a. Ansia e preoccupazione, cefalea;
 - b. Ipotensione, bradicardia, nausea, sudorazione;
 - c. Tutte le precedenti;
 - d. Nessuna delle precedenti;

2. La frequenza respiratoria di un neonato è di:
 - a. 30-33 atti al minuto
 - b. 40-45 atti al minuto
 - c. 50-55 atti al minuto
 - d. nessuna delle precedenti

3. In seguito alla legge istituyente gli ordini professionali, la nuova dicitura che assume la vecchia Federazione Nazionale del Collegio delle Ostetriche (FNCO) è:
 - a. FNOPA
 - b. FNOPO
 - c. FNOPU
 - d. FNOPE

4. La responsabilità penale è:
 - a. di tutta l'equipe assistenziale
 - b. strettamente personale e individuale
 - c. sempre del capo equipe
 - d. nessuna delle precedenti

5. Che cos'è un evento avverso?
 - a. danno causato ad una paziente dalla gestione sanitaria e non dipendente dalla sua condizione clinica
 - b. un incidente di particolare rilevanza per le potenziali conseguenze che avrebbe potuto causare alla paziente
 - c. tutte le risposte precedenti
 - d. nessuna delle risposte precedenti






6. Cosa si intende per anuria
- urina eliminata nelle 24 ore < 500 cc
 - urine eliminata nelle 24 ore < 100 cc
 - urina eliminata nelle 24 ore < 1000 cc
 - urina eliminata nelle 24 ore < 700 cc
7. Quali sono i criteri di inclusione per una donna che decide di partorire in acqua
- Partoanalgesia
 - BMI > 30
 - feto multiplo a termine di gravidanza
 - tampone vagino-rettale per rilevare la presenza di batteri Streptococcus agalatiæ negativo
8. Quale delle seguenti è una controindicazione alla partoanalgesia?
- rottura delle membrane
 - gravidanza alla 37 settimana di gestazione
 - gravida di età superiore a 40 anni
 - nessuna delle precedenti
9. Come viene valutata la crescita neonatale in allattamento esclusivo?
- 4 pannolini bagnati nelle 24 ore senza riduzione del peso corporeo neonatale
 - 8 pannolini bagnati nelle 24 ore senza riduzione del peso corporeo neonatale
 - 6 pannolini bagnati nelle 24 ore senza riduzione del peso corporeo neonatale
 - 10 pannolini bagnati nelle 24 ore senza riduzione del peso corporeo neonatale
10. Le donne in allattamento esclusivo possono fare uso di alcol?
- Mai
 - Sempre
 - associati a farmaci
 - nessuna delle precedenti



11. Un neonato itterico sottoposto alla fototerapia deve essere esposto alla luce:
- Vestito, senza particolari protezioni
 - Nudo, senza particolari protezioni
 - Nudo con una benda a protezione degli occhi
 - Nessuna delle risposte è corretta
12. Quando si parla di aree a basso rischio ostetrico (BRO) funzionali, ci si riferisce a:
- Aree all'interno dell'U.O. di ostetricia e ginecologia
 - Aree esterne ai presidi ospedalieri
 - Aree collegate all'interno dei consultori familiari
 - Aree funzionalmente collegate e adiacenti alla U.O. di Ostetricia e Ginecologia
13. I fattori di rischio per l'incontinenza urinaria sono:
- Fumo
 - Sedentarietà
 - Abuso di alcool e caffè
 - Tutte le precedenti
14. Nel diabete gestazionale con obesità, è accettabile un aumento ponderale di:
- 4-9 kg
 - 15-16 kg
 - 21-23 kg
 - 12-15 kg
15. La misurazione sinfisi pubica-fondo uterino è uno strumento di misurazione:
- Invasivo
 - Ormai in disuso
 - Non invasivo
 - Nessuna delle precedenti



Two handwritten signatures in black ink, one larger and more complex than the other.



16. L'Atosiban è:

- a. Un anticoagulante
- b. Un calcioantagonista
- c. Un antagonista recettoriale dell'ossitocina
- d. Un betabloccante

17. Quanti dosaggi di glicemia si fanno nell' OGTT 75mg?

- a. 4
- b. 5
- c. 3
- d. 1

18. In caso di donna gravida HIV positiva con carica virale molto elevata qual è la modalità di parto da prediligere?

- a. Parto in acqua
- b. Taglio cesareo a termine di gravidanza
- c. Taglio cesareo elettivo a 38 settimane e somministrazione di immunoglobuline al neonato
- d. Nessuna delle precedenti

19. Qual è il trattamento più appropriato della CIN III





- a. Elettrocoagulazione
- b. Isterectomia
- c. Terapia medica
- d. Conizzazione

20. Il rapporto tra compressioni e ventilazioni nel neonato è:


- a. 3:1 90 compressioni e 30 atti respiratori
- b. le compressioni devono essere continue
- c. 2:1 20 compressioni e 10 atti respiratori
- d. Nessuna delle precedenti



21. La IV manovra di Leopold permette di stabilire:
- a. La situazione fetale
 - b. L'atteggiamento fetale
 - c. Se la parte presentata è impegnata
 - d. Nessuna delle precedenti
22. Cosa definisce il Passo CAM OMS 2018 "le cure amiche della madre":
- a. Un'assistenza rispettosa dei bisogni della donna che include la possibilità di scelte consapevoli e un sostegno continuo
 - b. La presenza della persona scelta dalla donna durante il travaglio
 - c. Disponibilità di strategie di controllo del dolore
 - d. Tutte le precedenti
23. In quale di queste situazioni sarà maggiore il rischio di isoimmunizzazione materno-fetale da fattore RH?
- a. Madre plurigravida RH- e feto RH +
 - b. Madre RH+ e feto RH-
 - c. Madre RH- e feto RH-
 - d. Nessuna delle precedenti
24. La Profilassi dell'isoimmunizzazione da fattore RH va effettuata:
- a. Entro le prime 24 ore dal parto
 - b. Entro le prime 12 ore dal parto
 - c. Entro le prime 72 ore dal parto
 - d. Entro le prime 36 ore dal parto
25. Il Gas Utilizzato in Laparoscopia per indurre il pneumo-peritoneo è:
- a. O₂
 - b. CO₂
 - c. CO
 - d. Nessuna delle precedenti

26. L'interruzione farmacologica di gravidanza RU 486 :
- Attuabile entro la nona settimana di gestazione
 - Richiede degenza di giorni quattro
 - Controindicata nelle nullipare
 - Tutte le precedenti
27. La specificità di un test è definibile come :
- La capacità di identificare correttamente i soggetti sani
 - La capacità di identificare almeno il 50% dei pazienti sani
 - La capacità di identificare i soggetti malati
 - La capacità di identificare almeno il 50% dei pazienti malati
28. Definizione di plagiocefalia nel neonato:
- Deformazione del cranio, la testa non possiede più una forma regolare
 - Rigonfiamento del cranio dovuto a raccolta di sangue
 - Tumore vascolare di natura benigna
 - Tumefazione testicolare
29. VABRA è una tecnica utilizzata in quale organo femminile ?
- Tuba
 - Cervice
 - Ovaio
 - Endometrio
30. Cosa prevede attualmente lo screening del carcinoma della cervice
- HPV test
 - Prelievo ematico e tipizzazione di HPV
 - Ecografia pelvica annuale
 - Tutte le precedenti



PROVA NUMERO 2

1. La coniugata diagonale va:
 - a) Dall'arcata sotto-pubica al punto di mezzo del promontorio sacro-vertebrale
 - b) Dal margine superiore della sinfisi pubica al punto di mezzo del promontorio sacro-vertebrale
 - c) Da una eminenza ileopettinea all'altra
 - d) Nessuna delle precedenti

2. Qual è il tumore più frequente nel sesso femminile, per incidenza e mortalità?
 - a) Ovaio
 - b) Polmone
 - c) Cervice
 - d) Mammella

3. Con quale mezzo diagnostico viene diagnosticata la placenta previa?
 - a) Esami di laboratorio
 - b) Risonanza Magnetica
 - c) Ecografia
 - d) Nessuna delle precedenti

4. Che cos'è un farmaco tocolitico?
 - a) Un rilassante dell'utero
 - b) Un eccitante dell'utero
 - c) Tutte le precedenti
 - d) Nessuna delle precedenti

5. Per effettuare un raschiamento diagnostico della cavità uterina, dopo l'esplorazione vaginale ed accurata disinfezione, si deve:
 - a) Procedere all'isterometria
 - b) Eseguire curettage della cavità endometriale
 - c) Eseguire curettage della cavità endocervicale
 - d) Nessuna delle precedenti

6. Con Quale delle seguenti manovre di Leopold si pone diagnosi di epoca di gravidanza?
- a) Prima
 - b) Seconda
 - c) Terza
 - d) Quarta
7. Il prelievo per la misurazione del PH fetale sul cordone ombelicale viene eseguito:
- a) Subito dopo la nascita e prima del secondamento
 - b) Subito dopo il secondamento
 - c) Sul cordone non clampato
 - d) Sul cordone clampato e dopo il secondamento
8. L'episiotomia quando va effettuata?
- a) Sempre
 - b) Mai
 - c) Secondo giudizio clinico
 - d) Talvolta
9. L'amniorexi solitamente quando viene praticata?
- a) Sempre con una dilatazione di almeno 4cm
 - b) Sempre con una dilatazione di almeno 7cm
 - c) Secondo il caso clinico
 - d) Con dilatazione completa
10. In Quale dei seguenti casi è necessario praticare la profilassi anti-D, per una donna RH negativo?
- a) Amniocentesi
 - b) Villocentesi
 - c) Tutte le precedenti
 - d) Nessuna delle precedenti

11. Un ostetrica/o ha il dovere di contribuire all'attività di formazione ed aggiornamento. Questo comma fa parte:
- a) Del D.M. 740/1994
 - b) Della legge 42/99
 - c) Dal Codice Deontologico
 - d) Dalla legge 40/2004
12. Il tempo che intercorre tra la raccolta di un campione seminale e l'analisi microbiologica non deve superare:
- a) Sette ore
 - b) Dodici ore
 - c) Ventiquattro ore
 - d) Tre ore
13. Nell'attribuzione del punteggio di Apgar non viene preso in considerazione:
- a) Il colorito cutaneo
 - b) La frequenza cardiaca
 - c) Il riflesso pupillare
 - d) La reattività
14. Quale di queste non rappresenta una indicazione assoluta al taglio cesareo?
- a) Situazione trasversa
 - b) Prolasso del funicolo
 - c) Gravidanza quadrigemina
 - d) Precedente taglio cesareo
15. Qual è solitamente il primo segno o sintomo in una paziente con carcinoma della cervice?
- a) Stipsi
 - b) Lombalgia
 - c) Dispareunia
 - d) Perdita ematica dai genitali esterni





16. La chiusura di una ferita utilizzando mezzi di sutura è definita?

- a) Chiusura di prima intenzione
- b) Chiusura di seconda intenzione
- c) Granulazione
- d) Nessuna delle precedenti

17. L'ostetrica/o in un primo colloquio con una donna gravida normopeso quale indicazione dà in merito all'incremento ponderale?

- a) 5kg
- b) 12kg
- c) 16kg
- d) 20kg

18. La presentazione del feto può essere:

- a) Trasversa
- b) Cefalica
- c) Podalica
- d) Tutte le precedenti

19. Qual è l'agente eziologico che più frequentemente è causa di una mastite durante il periodo puerperale?

- a) Streptococco viridans
- b) Pilociano
- c) Stafilococco aureo
- d) Streptococco gruppo A

20. L'embolia amniotica è causata da:

- a) Ipertensione polmonare e ipossia
- b) Passaggio in circolo di liquido amniotico
- c) Infarto del miocardio acuto
- d) Nessuna delle precedenti

21. Si definisce protratta una gravidanza la cui durata superiore le:

- a) 40 settimana
- b) 38 settimane
- c) 45 settimane
- d) 42 settimane

22. L'ossitocina:

- a) È secreta dalla neuroipofisi
- b) Stimola le contrazioni uterine
- c) Facilita la fuoriuscita di latte materno
- d) Tutte le risposte precedenti

23. Qual è il fattore prognostico più importante nei tumori ovarici?


- a) La Ploidia
- b) Età
- c) Malattia residua all'intervento
- d) Nessuna delle precedenti

24. In una donna con endometriosi quale dei seguenti è spesso presente?

- a) Gravidanza
- b) Menopausa
- c) Fibroma uterino
- d) Dismenorrea

25. Una donna gravida può effettuare immersioni subacquee

- a) Sì per tutta la gravidanza
- b) No
- c) Solo nel terzo trimestre
- d) Nessuna delle risposte precedenti



Handwritten signatures and initials, including a large signature on the left, a signature on the right, and initials 'RU' and 'DG' at the bottom.



26. Qual è la lunghezza media di un neonato a termine di gravidanza?
- a) 35 cm
 - b) 40 cm
 - c) 50 cm
 - d) 60 cm
27. In caso di arresto cardiocircolatorio di una donna gravida alla 29° settimana di gestazione, l'outcome materno migliora se :
- a. Il Taglio cesareo viene espletato nel posto in cui è avvenuto l'arresto cardiaco
 - b. Si trasporta la gravida in terapia intensiva/ unità coronarica
 - c. Si posiziona la gravida in decubito laterale sinistro
 - d. Nessuna delle precedenti
28. Quando i villi coriali penetrano nel miometrio la placenta è:
- a. Normoinserita
 - b. Increta
 - c. Accreta
 - d. Percreta
29. La tecnica del Mammottone in cosa consiste:
- a. Si tratta di un agobiopsia della mammella mirata e precisa
 - b. Si tratta di un agobiopsia della cervice mirata e precisa
 - c. E' una tecnica di ecografia di secondo livello
 - d. E' uno strumento utilizzato nella chirurgia ginecologica robotica
30. L'embolia amniotica è causata da :
- a. Ipertensione polmonare e ipossia
 - b. Passaggio in circolo di liquido amniotico
 - c. Infarto miocardico acuto
 - d. Nessuna delle precedenti



PROVA NUMERO 3

1. La frequenza del battito cardiaco fetale di norma è:
 - a) 60/90 battiti minuto
 - b) 110/160 battiti minuto
 - c) 90/120 battiti minuto
 - d) Nessuna delle precedenti

2. La guarigione di una ferita può avvenire:
 - a) Solo per "prima intenzione"
 - b) Solo per "seconda intenzione"
 - c) "Per prima e seconda intenzione"
 - d) Nessuna delle precedenti

3. La sintomatologia caratteristica della placenta previa è:
 - a) Ipertono e perdita di sangue rosso vivo
 - b) Assenza di ipertono e perdite di sangue rosso vivo
 - c) Perdita di sangue rosso scuro e ipertono uterino
 - d) Nessuna delle precedenti

4. Nella valutazione del dolore la scala NRS è rappresentata da una retta con:
 - a) Aree di diverso colore dove l'intensità del colore corrisponde all'intensità del dolore
 - b) Una serie di numeri progressivi, da 1 a 10, dove 1 corrisponde a nessun dolore e 10 al massimo
 - c) Due estremità che corrispondono a "nessun dolore" e "massimo dolore"
 - d) Nessuna delle precedenti

5. In quale dei seguenti casi l'ostetrica/o è tenuta/o al lavaggio antisettico delle mani?
 - a) Prima di una qualsiasi procedura
 - b) Prima del contatto diretto del paziente
 - c) Prima e dopo l'esecuzione di alcune manovre invasive come un catetere venoso
 - d) Dopo aver effettuato un prelievo di sangue ad un paziente apparentemente sano

6. A che epoca gestazionale in una donna RH negativo viene consigliata la somministrazione di immunoglobuline per il fattore RH?
- a) 15 settimane
 - b) 16 settimane
 - c) 28 settimane
 - d) 30 settimane
7. In che momento deve essere fatto il prelievo ematico per un'emocoltura?
- a) Non appena compare uno stata febbrile con brivido
 - b) Solo dopo 7 giorni di terapia antibiotica
 - c) Appena si effettua il ricovero
 - d) Nessuna delle precedenti
8. A che epoca gestazione viene eseguito il test combinato?
- a) Tra l'11 e la 13 settimana
 - b) Tra la 10 e l' 11 settimana
 - c) Tra l'11 e la 15 settimana
 - d) Tra l'11 e la 14 settimana
9. Quali sono i benefici neonatali dello skin to skin?
- a) Regolazione della temperatura corporea
 - b) Controllo della frequenza cardiaca
 - c) Produzione di ossitocina
 - d) Tutte le precedenti risposte
10. Quando i villi coriali penetrano nel miometrio la placenta è:
- a) Normoinserita
 - b) Increta
 - c) Accreta
 - d) Percreta



11. In base alle ultime linee guida sulla gravidanza fisiologica lo screening delle Rosolia viene consigliato?
- a) A tutte le donne
 - b) Alle donne risultate negative con gli esami preconcezionali
 - c) Non è più consigliato
 - d) Nessuna delle precedenti
12. Come si previene la trasmissione da citomegalovirus?
- a) Evitando il contatto con i bambini piccoli
 - b) Evitando di baciare in bocca i bambini
 - c) Lavando le mani subito dopo il cambio dei pannolini
 - d) tutte le precedenti
13. Con l'acronimo CAN cosa si intende:
- a) Corso di accompagnamento alla nascita
 - b) Corso di accompagnamento alla natività
 - c) Corso di accompagnamento alla natura
 - d) Tutte le precedenti
14. In Base alle ultime Linee guida sulla gravidanza fisiologica a chi viene consigliato di eseguire lo screening per la malattia di Chagas?
- a) Ai provenienti del Sua Africa
 - b) Ai provenienti del Nord Europa
 - c) Ai provenienti del Nord America
 - d) Ai provenienti del Sud America
15. Una donna in gravidanza con quale modalità può contrarre la malattia di Chagas?
- a) Vettoriale
 - b) Orale
 - c) Trasmessa
 - d) Tutte le precedenti



16. L'agenda di gravidanza è scaricabile dal sito della Regione Piemonte?

- a) No
- b) Si
- c) Solo in Parte
- d) Solo la parte della prescrizione degli esami

17. In base alle ultime linee guida della gravidanza fisiologica lo screening della batteriuria asintomatica in gravidanza:

- a) Non dovrebbe essere offerto a tutte le donne
- b) Dovrebbe essere offerto a tutte le donne
- c) Deve essere offerto a tutte le donne nel secondo trimestre della gravidanza
- d) Nessuna delle precedenti

18. Cosa valuta il punteggio di Bishop?

- a) Maturazione cervicale
- b) Rottura delle membrane
- c) Perdite ematiche
- d) Nessuna delle precedenti

19. Dalle ultime raccomandazioni OMS la medicazione di una ferita chirurgica:

- a) Deve essere sempre rinnovata dopo 6 ore dall'intervento
- b) Non va toccata fino alla dimissione
- c) Non va toccata per un minimo di 48 ore a meno che non si verifichino perdite
- d) Nessuna delle precedenti

20. Quali sono le caratteristiche di un'infezione del sito chirurgico:

- a) Colore
- b) Rossore
- c) Dolore
- d) Tutte le precedenti

21. Secondo il protocollo Eras (Enhanced, Recovery, After, Surgery) nel post operatorio è importante:
- a) Prevenire nausea e vomito
 - b) Favorire la mobilizzazione precoce
 - c) Controllare il dolore
 - d) Tutte le precedenti
22. La Legge 219/2017 contenente norme in materia di consenso informato stabilisce:
- a) Che il consenso informato è inserito in cartella clinica
 - b) In ogni momento il paziente può rivedere le sue decisioni
 - c) Il consenso si acquisisce nei modi più idonee alle condizioni del paziente
 - d) Tutte le precedenti
23. Secondo la piramide delle evidenze scientifiche stanno a livello più alto:
- a) Case Report
 - b) Studi Case controllo
 - c) Studi di coorte
 - d) Revisioni sistematiche
24. I LEA con quale decreto sono stati definiti?
- a) D.P.C.M. 29/11/2000
 - b) D.L. 30/12/2020
 - c) D.L. 229/1999
 - d) Nessuna delle precedenti
25. Trattamento della gravidanza tubarica:
- a) Chirurgico
 - b) Farmacologico
 - c) Ecografico
 - d) Tutte le precedenti

26. Il modello HUB e SPOKE in sanità:

- a) HUB (raggio) centro periferico, SPOKE (mozzo) centro di eccellenza, di riferimento o di macro area;
- b) HUB e SPOKE non vengono utilizzati nella sanità italiana in quanto trattasi di un modello organizzativo irripetibile;
- c) HUB (mozzo) centri di eccellenza, di riferimento o di macro area e SPOKE (raggio) centri periferici;
- d) Nessuna delle precedenti

27. Dove applica l'azione principale la pillola estro- progestinica?

- a) Ipofisi ed ipotalamo
- b) Ipotalamo
- c) Cervelletto
- d) Gonadi

28. Nella presentazione di fronte qual è il diametro d'impegno ?

- a) Sottomento/ bregmatico
- b) Occipito/frontale
- c) Occipito/mentoniero
- d) Fronte/bregma

29. In ricerca, con il termine PICO, cosa si intende:

- a) Popolazione, infezione, contenimento, outcome
- b) Patologia, istituto, consapevolezza, obiettivi
- c) Partecipare, intervenire, coordinare, ottenere
- d) Popolazione, intervento, confronto, outcome

30. Per la diagnosi di tromboembolia polmonare, quale esame giudicherebbe gold standard per la diagnosi:

- a) Angio-TAC
- b) Ecografia
- c) Rx torace
- d) Emogasanalisi