

Concorso pubblico per titoli ed esami
Fisioterapisti
2022

TEST - 1 -

1. La pressione esercitata da un bendaggio è:
 - a) Direttamente proporzionale all'altezza della benda utilizzata;
 - b) Direttamente proporzionale al raggio di curvatura della superficie compressa;
 - c) Dipende esclusivamente dal numero delle spire (giri) applicate;
 - d) **Direttamente proporzionale alla tensione applicata e inversamente proporzionale al raggio di curvatura della superficie compressa.**
2. Il segno di Stemmer è:
 - a) **Uno strumento diagnostico affidabile per riconoscere il linfedema;**
 - b) Uno strumento diagnostico affidabile per riconoscere l'insufficienza arteriosa cronica;
 - c) Una risposta anomala al riflesso cutaneo plantare;
 - d) Un segno di tessuto edematoso ad alto contenuto di acqua.
3. In seguito ad un intervento chirurgico mammario in caso di comparsa di "scapola alata", quale nervo è interessato?
 - a) **Toracico lungo;**
 - b) Muscolo-cutaneo;
 - c) Soprascapolare;
 - d) Ascellare.
4. La Continuous Positive Airways Pressure-Non Invasive Ventilation (CPAP-NIV) consiste:
 - a) **Nell'insufflazione di aria e ossigeno a pressione positiva in modo continuo e non invasivo negli alveoli, per tutta la durata del ciclo respiratorio, in paziente in respiro spontaneo;**
 - b) Nell'insufflazione di aria e ossigeno a pressione negativa in modo continuo e non invasivo negli alveoli, per tutta la durata del ciclo respiratorio, in paziente in respiro spontaneo;
 - c) Nell'insufflazione di aria e ossigeno a pressione positiva in modo continuo e non invasivo negli alveoli, per la durata della fase inspiratoria, in paziente in respiro spontaneo;
 - d) Nell'insufflazione di aria e ossigeno a pressione negativa in modo continuo e non invasivo negli alveoli, per la durata della fase espiratoria, in paziente in respiro spontaneo.
5. La Macchina della Tosse:
 - a) **Fornisce una pressione inspiratoria ed espiratoria (impostabili) che attraverso il potenziamento delle due fasi tossive, favorisce l'espulsione delle secrezioni;**
 - b) Non può essere utilizzata in pazienti tracheostomizzati;
 - c) Può essere utilizzata in età pediatrica solo per la fibrosi cistica;
 - d) Aumenta il rischio di infezioni respiratorie.

6. Quale di queste affermazioni è falsa?
- a) Il pavimento pelvico esercita sostegno e supporto degli organi pelvici;
 - b) Il pavimento pelvico collabora in sinergia con il muscolo diaframma;
 - c) Il pavimento pelvico contribuisce a mantenere un equilibrio stabile del corpo durante le attività quotidiane;
 - d) **La sua contrazione non può essere dissociata da quella dei muscoli addominali.**
7. Il meccanismo d'azione della Tossina Botulinica è:
- a) Blocco reversibile della liberazione di acetilcisteina a livello delle sinapsi colinergiche (muscolari, ghiandolari etc...);
 - b) **Blocco reversibile della liberazione di acetilcolina a livello delle sinapsi colinergiche (muscolari, ghiandolari etc...);**
 - c) Blocco irreversibile della liberazione di acetilcolina a livello delle sinapsi colinergiche (muscolari, ghiandolari etc...);
 - d) Nessuna delle risposte è corretta.
8. Che cosa si intende con il termine Freezing?
- a) **Lo stato di acinesia paradossa, in cui i piedi sembrano incollati al suolo;**
 - b) L'ipertono muscolare che interessa tutta la muscolatura, opponendo resistenza omogenea alla mobilizzazione passiva;
 - c) La lentezza nella ideazione e nella verbalizzazione, con deficit attentivo e di concentrazione;
 - d) La postura rigida tipica del paziente parkinsoniano: cifosi del rachide flessione degli arti inferiori.
9. La scala di Norton è:
- a) Uno strumento di individuazione del grado di dipendenza del paziente;
 - b) Uno strumento di rilevazione del danno sensoriale di un paziente;
 - c) **Uno strumento per individuare pazienti a rischio di lesioni cutanee da pressione;**
 - d) Una scala per la stadiazione delle ustioni.
10. Il quadro sintomatologico della Sclerosi Multipla è:
- a) **Variabile in base alla localizzazione delle aree demielinizzate;**
 - b) Caratterizzato sempre dalla presenza di disturbi di tipo cerebellare;
 - c) Caratterizzato sempre dalla spasticità;
 - d) Caratterizzato da un quadro misto con la presenza di disturbi di tipo cerebellare e di spasticità.
11. Che cosa s'intende per prassie transitive?
- a) **Atti motori volontari finalizzati che implicano l'utilizzo di un oggetto;**
 - b) Atti motori volontari che non implicano l'utilizzo di un oggetto;
 - c) Atti motori involontari indirizzati verso oggetti;
 - d) Atti motori involontari ed afinalistici.

12. La causa di emorragia subaracnoidea non traumatica è:

- a) **Un aneurisma;**
- b) Una malformazione artero-venosa;
- c) Tumori intracranici;
- d) Nessuna delle precedenti.

13. La "Sindrome Frontale o Sindrome Disesecutiva" si distingue per:

- a) **Scarsa autocritica e capacità di giudizio;**
- b) Tremore a riposo;
- c) Assenza di ROT;
- d) Freezing.

14. La Sindrome del Tunnel Cubitale è dovuta:

- a) Compressione del n. radiale a livello del polso;
- b) Compressione del n. radiale a livello del gomito;
- c) Compressione del n. ulnare a livello del polso;
- d) **Compressione del n. ulnare a livello del gomito.**

15. Con un deficit della conduzione nervosa senza soluzione di continuo dell'assone parleremo di:

- a) Assonotmesi;
- b) **Neuroaprassia;**
- c) Neurotmesi;
- d) Neuroagnosia.

16. Quali sono i gradi di libertà articolare di un ginglimo laterale (trocoide)?


- a) **Un grado;**
- b) Due gradi;
- c) Tre gradi;
- d) Quattro gradi.

17. L'amputazione del piede secondo Lisfranc richiede per la deambulazione...

- a) Una vera e propria ortesi;
- b) Una protesi;
- c) **Solo un riempimento nella scarpa e un laccio alla caviglia sopra la scarpa;**
- d) Nessuna delle precedenti risposte è corretta.

18. L'alluce rigido è l'esito di...

- a) Un intervento chirurgico con viti e placche;
- b) Un trauma da schiacciamento con frattura;
- c) Una deviazione del primo raggio del piede;
- d) **Un processo degenerativo a carico delle articolazioni del I dito del piede.**



19. Le ortesi digitali realizzate in silicone medicale:

- a) Migliorano l'allineamento delle dita;
- b) Proteggono le sporgenze ossee;
- c) Possono essere indossate nelle calzature normali;
- d) **Tutte le precedenti.**

20. L'intrarotazione di spalla è determinata da una contrazione:

- a) **Del sottoscapolare;**
- b) Del gran dentato;
- c) Del grande romboide;
- d) Del tricipite brachiale (capo lungo).

21. Un paziente che ha subito un intervento chirurgico a seguito di frattura dell'anca:

- a) Necessita di almeno 48-72 ore di immobilità assoluta dell'arto;
- b) **Può essere mobilizzato nelle prime 24 ore dall'intervento;**
- c) Deve essere stimolato a compiere in tempi brevi o brevissimi movimenti di adduzione e flessione oltre i 90°;
- d) Può ricavare beneficio dall'utilizzo di dispositivi di immobilizzazione che blocchino almeno l'articolazione del ginocchio.

22. In un passo, la fase di appoggio impegna percentualmente circa:


- a) Il 20% del ciclo;
- b) Il 35% del ciclo;
- c) Il 50% del ciclo;
- d) **Il 60% del ciclo.**

23. La scala di valutazione VAS:

- a) **Si può somministrare solamente a da soggetti adulti cognitivamente integri;**
- b) Riesce a definire con esattezza il massimo dolore percepibile del paziente;
- c) Richiede un tempo di somministrazione superiore a 10 minuti;
- d) Valuta la complessità del dolore in soggetti cognitivamente integri.

24. L'assetto anomalo della scapola, detto "scapola alata", indica un deficit dell'azione di quale muscolo:

- a) Romboide;
- b) **Gran dentato;**
- c) Gran dorsale;
- d) Gran pettorale.

25. Il test di Jobe è positivo se:

- a) Vi è presenza di dolore e/o debolezza muscolare del sottoscapolare;
- b) Vi è presenza di dolore e/o debolezza muscolare del sovraspinato;**
- c) Vi è presenza di dolore e/o debolezza muscolare del piccolo rotondo;
- d) Vi è presenza di dolore e/o debolezza muscolare del romboide.

26. Il Test di McMurray valuta:

- a) La presenza di lesioni meniscali del ginocchio si esegue posizionando il paziente prono;
- b) La presenza di lesioni meniscali del ginocchio si esegue posizionando il paziente supino;**
- c) La presenza di lesioni meniscali del ginocchio si esegue posizionando il paziente seduto con le gambe giù dal letto;
- d) Nessuna delle risposte è corretta.

27. La Plagiocefalia sinostotica isolata(SP) è:


- a) Una forma di craniosinostosi sindromica caratterizzata dalla fusione prematura di una sutura coronale, che causa deformità del cranio e simmetria facciale;
- b) Una forma di craniosinostosi non sindromica caratterizzata dalla fusione prematura di una sutura coronale, che causa deformità del cranio e simmetria facciale;**
- c) Una forma di craniosinostosi sindromica caratterizzata dalla fusione prematura di una sutura coronale, che causa deformità del cranio a livello frontale;
- d) Una forma di craniosinostosi sindromica caratterizzata dalla fusione prematura di una sutura coronale, che causa deformità del cranio a parietale e occipitale.

28. Quali tra le seguenti forme di Paralisi Cerebrale infantile si caratterizza tipicamente per una notevole riduzione del tono muscolare?

- a) La diplegia;
- b) La tetraparesi spastica;
- c) L'emiplegia;
- d) L'atetosi.**


29. In quale forma di piede torto congenito non è risolutiva una terapia integrata costituita da manipolazioni, apparecchi gessati e utilizzo di scarpe a biscotto?

- a) Piede equino varo addotto supinato di I grado;
- b) Piede equino varo addotto supinato di II grado;
- c) Piede equino varo addotto supinato di III grado;**
- d) Piede talo valgo.



30. Quale fra le seguenti posizioni è da sconsigliare al paziente, operato con via d'accesso postero-laterale, perché favorisce la lussazione della protesi d'anca?


- a) Abduzione, flessione, intrarotazione;
- b) Abduzione, flessione, extrarotazione;
- c) **Adduzione, flessione, intrarotazione;**
- d) Adduzione, estensione, extrarotazione.



Concorso pubblico per titoli ed esami
Fisioterapisti
2022

TEST - 2 -

1. Il linfedema è caratterizzato da:
 - a) Simmetria del segno, assenza di dolore in assenza di complicanze e colorito pallido-cereo;
 - b) Asimmetria del segno, assenza di dolore in assenza di complicanze e colorito pallido-cereo;**
 - c) Asimmetria del segno, colore rosso-violaceo, dolore al tatto;
 - d) Asimmetria del segno, termotatto fresco, dolore al tatto.
2. L'elastocompressione è controindicata:
 - a) Nelle arteriopatie severe;**
 - b) Nei bambini di età inferiore ai 4 anni;
 - c) Negli edemi con segno della fovea positivo;
 - d) Se presente il segno di Stemmer.
3. La Non Invasive Ventilation (NIV) ha la funzione di:
 - a) Supportare la muscolatura toracica nella fase di espirazione eliminando l'anidride carbonica dal sangue;
 - b) Supportare il diaframma e gli altri muscoli espiratori nel fare espellere in maniera adeguata l'aria, eliminando l'anidride carbonica dal sangue;
 - c) Supportare il diaframma e gli altri muscoli inspiratori nel fare entrare la corretta quantità di aria nei polmoni e di espellere in maniera adeguata l'aria, eliminando l'anidride carbonica dal sangue;**
 - d) Supportare la cassa toracica e il diaframma, sia in fase inspiratoria, sia in fase espiratoria per fare entrare ed uscire la corretta quantità di aria dai polmoni favorendo un equilibrato scambio tra ossigeno e anidride carbonica.
4. L'incentivazione respiratoria volumetrica mira a:
 - a) Garantire volumi respiratori adeguati o fisiologici;
 - b) Espandere tutti gli alveoli;
 - c) Aumentare la forza dei muscoli inspiratori;**
 - d) Aumentare la forza dei muscoli espiratori.
5. Nella respirazione si definisce volume corrente:
 - a) La quantità di aria inspirata normalmente;
 - b) La quantità di aria espirata;
 - c) La quantità di aria che si inspira ed espira durante un atto respiratorio normale;**
 - d) La quantità di aria che può essere espirata con una espirazione forzata.



6. Il diaframma pelvico profondo è costituito da:
- a) Muscolo pubo-coccigeo, muscolo ileo-coccigeo, muscolo bulbó-cavernoso;
 - b) Muscolo pubo-coccigeo, muscolo ileo coccigeo, muscolo ischio-coccigeo;**
 - c) Muscolo trasverso profondo del perineo, muscoli ischio cavernosi e muscolo pubo-rettale;
 - d) Muscolo pubo-coccigeo, muscolo ileo coccigeo, muscolo ischio-coccigeo e muscolo trasverso profondo del perineo.
7. Effetti indesiderati prodotti dall'iniezione di Tossina Botulinica:
- a) Dolore nel sito d'iniezione, ecchimosi, edema;
 - b) Raramente sindrome simil-influenzale;
 - c) Se pur clinicamente in modo non rilevante a distanza di tempo problemi di trasmissione neuro-muscolari;
 - d) Tutte le risposte sono corrette.**
8. L'eccitabilità dei singoli assoni è:
- a) Direttamente proporzionale al loro diametro;
 - b) Indipendente dal diametro;
 - c) Inversamente proporzionale al loro diametro;**
 - d) Direttamente proporzionale all'intensità dello stimolo.
9. Quale tra i seguenti segni non è specifico di una lesione del nervo faciale?
- a) Spianamento delle rughe della fronte;
 - b) Iperacusia;
 - c) Lagofalmo;
 - d) Difficoltà di deglutizione.**
10. La sindrome della cauda è determinata da compressioni del canale vertebrale al di sotto di
- a) L - 1;
 - b) L - 2;**
 - c) L - 3;
 - d) L - 4.
11. Il disturbo aprassico non influisce su...
- a) Esecuzione di gesti su richiesta;
 - b) Gestualità simbolica;
 - c) Esecuzione di gesti automatici;**
 - d) Esecuzione di gesti che richiedono l'uso di oggetti.
12. La "Sindrome Frontale o Sindrome Disesecutiva" comporta deficit nella:
- a) Pianificazione e problem solving;
 - b) Flessibilità cognitiva;
 - c) Nella memoria di lavoro;
 - d) Tutte le risposte sono corrette.**

13. Il Neuroma di Morton è:

- a) Una forma neoplastica che si localizza prevalentemente a livello midollare;
- b) Un tumore dei nervi spinali;
- c) **Una compressione del 3° nervo interdigitale;**
- d) Nessuna delle risposte è corretta.

14. La Sindrome del Canale di Guyon si origina quando:

- a) **Il n. ulnare viene compresso e/o irritato nel canale di Guyon;**
- b) Il n. radiale viene compresso e/o irritato nel canale di Guyon;
- c) Il n. peroneo viene compresso e/o irritato nel canale di Guyon;
- d) Il n. tibiale viene compresso e/o irritato nel canale di Guyon.

15. Quando un paziente non è consapevole del suo stato di malattia, manifestando invece la ferma convinzione di possedere ancora le capacità che ha perso in seguito a lesione cerebrale, ci si trova di fronte ad un problema di:

- a) Agnosia;
- b) **Anosoagnosia;**
- c) Emisomatoagnosia;
- d) Prosopoagnosia.

16. Nel caso di interruzione della conduzione nervosa con discontinuità dell'assone che va incontro a degenerazione ma con integrità delle guaine nervose, parleremo di:


- a) **Assonotmesi;**
- b) Neuroaprassia;
- c) Neurotmesi;
- d) Neuroagnosia.

17. Quale fra le seguenti affermazioni sulla postura è corretta?

- a) Non viene mai modificata dal soggetto per evitare le compressioni di taglio;
- b) **Varia in relazione al compito che l'individuo sta svolgendo;**
- c) Non si modifica in relazione alle perturbazioni esterne;
- d) È fissa e imm modificabile dopo la maturazione del SNC.

18. Che cosa favoriscono le scale di valutazione?

- a) Una lettura oggettiva e confrontabile dei fenomeni assistenziali;
- b) Una omogenea valutazione quali-quantitativa dell'assistenza al paziente;
- c) Lo scambio di informazioni tra discipline diverse;
- d) **Tutte le risposte sono corrette**



19. Definizione di proprioccezione:

- a) È la capacità di riconoscere la posizione e il movimento del proprio corpo nello spazio senza l'ausilio della vista;
- b) È la capacità di riconoscere la posizione e il movimento del proprio corpo nello spazio con l'ausilio della vista;
- c) È la capacità di riconoscere il movimento del proprio corpo in uno spazio senza punti di riferimento;
- d) È la capacità di riconoscere degli oggetti con l'esplorazione tattile:

20. Quale tra i seguenti muscoli non svolge l'azione di estensione sull'articolazione dell'anca:

- a) Grande gluteo;
- b) **Tensore della fascia lata;**
- c) Semitendinoso;
- d) Semimembranoso.

21. Quali sono tutte le azioni proprie dei muscoli interossei palmari:

- a) Abduzione e flessione delle metacarpofalangee;
- b) Adduzione delle metacarpoifalangee;
- c) **Adduzione e flessione delle mtacarpofalangee, estensione delle interfalangee;**
- d) Adduzione ed estensione delle metacarpofalangee.

22. Per il rinforzo del quadricipite dopo un intervento di ricostruzione del legamento crociato anteriore (LCA) con tendine semimembranoso e gracile, nell'immediato post operatorio non è indicato utilizzare esercizi con:


- a) **Resistenza manuale al terzo inferiore della tibia;**
- b) Resistenza al terzo superiore della tibia;
- c) Elastici;
- d) Biofeedback (BFB).

23. A quali problematiche può portare nel tempo il mal appoggio del piede?


- a) Fasciti plantari;
- b) Alluce valgo;
- c) Metatarsalgia da sovraccarico;
- d) **Tutte le precedenti.**

24. Quale tra le principali tappe posturo-motorie del bambino non è corretta:

- a) **1.5 mesi controllo antigravitario del capo;**
- b) 8 mesi stazione seduta autonoma;
- c) 12 mesi deambulazione autonoma;
- d) Tra i 7 e 11 mesi gattonamento.



25. La Commissione Intersocietaria per l'Osteoporosi nelle Linee Guida sulla gestione dell'Osteoporosi e delle Fratture da fragilità afferma che:
- a) **Periodi anche brevi di immobilizzazione influenzano negativamente la massa ossea ed è quindi importante mantenere un livello di attività fisica adeguato;**
 - b) Non sono noti rapporti tra i livelli di attività e la massa ossea;
 - c) La massa ossea è influenzata negativamente solo da lunghi periodi di immobilizzazione, in questo caso è importante mantenere un livello di attività adeguato;
 - d) Periodi anche brevi di immobilizzazione riducono la massa ossea nella donna.
26. Il test di Speed è positivo se:
- a) **Vi è presenza di dolore sulla faccia anteriore della spalla;**
 - b) Vi è presenza di dolore alla flessione del gomito;
 - c) Vi è presenza di dolore all'estensione del gomito;
 - d) Vi è presenza di dolore sulla faccia postero-laterale della spalla.
27. Il Test di Apley valuta:
- a) Il grado di condropatia sotto-rotulea;
 - b) La presenza di lesioni al collaterale mediale del ginocchio;
 - c) **La presenza di lesioni meniscali del ginocchio;**
 - d) La presenza di lesioni al legamento crociato posteriore del ginocchio.
28. Che tipo di conflitto femoro-actabolare (FAI) è possibile riscontrare?
- a) Conflitto di tipo Cam;
 - b) Conflitto di tipo Pincer;
 - c) Conflitto di tipo misto;
 - d) **Tutte le risposte sono corrette.**
29. Plagiocefalia posizionale e torcicollo posturale possono migliorare spontaneamente?
- a) No, è necessario intervenire con ausili ortopedici correttivi;
 - b) **Sì, se si seguono corretti consigli posturali;**
 - c) No, è sempre necessario l'intervento chirurgico;
 - d) Nessuna delle risposte è corretta;
30. Qual è la posizione indicata come prioritaria per i neonati con insufficienza respiratoria acuta?
- a) Decubito laterale sinistro;
 - b) Decubito laterale destro;
 - c) **Prona;**
 - d) Supina.




Concorso pubblico per titoli ed esami
Fisioterapisti
2022

TEST - 3 -

1. Le bende elastiche a corta estensibilità si estendono:
 - a) <70%;
 - b) <50%;
 - c) <20%;
 - d) Tra il 10% e il 30%.
2. Dopo chirurgia dei tumori testa collo, quale segno è indice di lesione del n. accessorio spinale?
 - a) Innalzamento della spalla interessata rispetto al controlaterale;
 - b) **Spianamento della fossa sovra-claveare;**
 - c) Incapacità ad eseguire la rotazione esterna;
 - d) Incapacità ad elevare la spalla oltre i 110°.
3. La fatigue:
 - a) **È una sensazione di estrema stanchezza fisica, emotiva e cognitiva che colpisce il paziente oncologico;**
 - b) Non è mai presente nei bambini con patologie oncologiche;
 - c) Si attenua con il riposo e il sonno;
 - d) Contrindica l'attività motoria moderata.
4. Nel paziente in ventilazione meccanica invasiva la posizione prona è raccomandata:
 - a) Per almeno 5-6h/die, iniziando non prima di 120h dall'intubazione endotracheale;
 - b) **Per almeno 12-16h/die, meglio se entro 72h dall'intubazione endotracheale;**
 - c) In alternanza alla supinazione ogni 2h, non prima di 72h dall'intubazione endotracheale;
 - d) Nessuna risposta è corretta.
5. Quali tra le pratiche più comunemente utilizzate in fisioterapia respiratoria sono sconsigliate con pazienti affetti da Covid-19 in fase acuta?
 - a) Utilizzo di CPAP;
 - b) Utilizzo di NIV;
 - c) Mantenere il paziente in posizione semi-seduta (30-45°);
 - d) **Utilizzo di spirometria incentivante.**
6. Il Six Minute Walking Test:
 - a) **E' controindicato in presenza di angina instabile e di infarto miocardico nel mese precedente;**
 - b) E' controindicato nei pazienti con asma allergica;
 - c) Prevede che il paziente cammini lentamente superando dislivelli;
 - d) Prevede che il paziente cammini alla sua abituale andatura su tapis roulant.

7. Quali sono le cause primarie di incontinenza urinaria dopo intervento di prostatectomia radicale?
 - a) Parziale denervazione;
 - b) Danno chirurgico sullo sfintere uretrale interno;
 - c) Accorciamento della lunghezza anatomica e funzionale dell'uretra;
 - d) **Tutte le risposte sono corrette.**
8. Dopo l'inoculazione la Tossina Botulinica inizia il suo effetto:
 - a) All'incirca dopo due giorni, l'effetto può perdurare per un mese;
 - b) **All'incirca dopo due settimane, l'effetto può perdurare da tre a sei mesi;**
 - c) All'incirca dopo un giorno, l'effetto può perdurare da uno a due mesi;
 - d) All'incirca dopo una settimana, l'effetto può perdurare da cinque a otto mesi.
9. Quale tra i seguenti muscoli non è innervato dal radiale?
 - a) L'estensore comune delle dita;
 - b) Il tricipite brachiale;
 - c) **Il coraco-brachiale;**
 - d) Il supinatore.
10. Nella lesione cerebellare non riscontriamo:
 - a) Adiadococinesia;
 - b) **Tremore a riposo;**
 - c) Nistagmo;
 - d) Ipotonia.
11. La scala di Glasgow viene utilizzata per misurare:
 - a) Il rischio di caduta accidentale nei pazienti anziani;
 - b) Il rischio di insorgenza di una lesione da pressione;
 - c) Lo stato di salute di un neonato alla nascita;
 - d) **Lo stato di coscienza.**
12. Un paziente con una lesione del lobo parietale può:
 - a) Avere difficoltà a riconoscere gli oggetti altatto;
 - b) Essere incapace di localizzare lo stimolo;
 - c) Essere incapace di identificare il tipo di stimolo;
 - d) **Tutte le precedenti.**
13. Quale tra queste affermazioni non è corretta nell'aprassia ideomotora:
 - a) **Il disturbo è spesso monolaterale;**
 - b) Il paziente non è in grado di descrivere verbalmente la sequenza motoria da eseguire;
 - c) La difficoltà è maggiore nelle sequenze motorie complesse;
 - d) A volte compromette anche l'esecuzione di gesti automatici.



14. La "Sindrome Frontale o Sindrome Disesecutiva" si distingue per:

- a) **Scarsa autocritica e capacità di giudizio;**
- b) Tremore a riposo;
- c) Assenza di ROT;
- d) Freezing.

15. Quando un paziente non riconosce gli oggetti più familiari mediante gli organi di senso, ci si trova di fronte ad un problema di:

- a) **Agnosia;**
- b) Anosoagnosia;
- c) Emisomatoagnosia;
- d) Prosopoagnosia.

16. Quando un paziente non è in grado di riconoscere i volti noti e, talvolta, perfino il proprio volto quando si guarda allo specchio o in fotografia, ci si trova di fronte ad un problema di:

- a) **Agnosia;**
- b) Anosoagnosia;
- c) Emisomatoagnosia;
- d) **Prosopoagnosia.**

17. Nel caso di interruzione della conduzione nervosa con sezione del nervo intero o di un numero vario di assoni con lesione delle guaine endoneurali, parleremo di:


- a) Assonotmesi;
- b) Neuroaprassia;
- c) **Neurotmesi;**
- d) Neuroagnosia.

18. Le fratture cotiloidee sono:

- a) Frequentemente causate da trauma indiretto;
- b) Talora associate a trauma da cruscotto;
- c) Frequentemente associate a lussazione dell'anca;
- d) **Tutte le precedenti.**

19. L'articolazione radio-ulnare prossimale è:

- a) **Una trocoide;**
- b) Una troclea;
- c) Una condiloartrosi;
- d) Nessuna delle precedenti risposte è esatta.



20. Quali fra i seguenti legamenti dell'anca è teso durante il movimento di flessione dell'anca stessa?

- a) L'ileo-femorale;
- b) Il pubo-femorale;
- c) L'ischio-femorale;
- d) **Nessuno dei legamenti citati.**

21. Il test di Jobe valuta la funzionalità del muscolo:

- a) Gran dentato;
- b) Sottoscapolare;
- c) **Sovraspinoso;**
- d) Grande rotondo.

22. Quali tra le seguenti fratture presenta il più alto rischio di necrosi della testa femorale?

- a) **Frattura sottocapitata;**
- b) Frattura pertrocanterica;
- c) Frattura sottotrocantetrica;
- d) Frattura diafisaria.

23. Per la valutazione a forza 3 dei muscoli abduttori dell'anca, il paziente è posto in:


- a) Posizione prona;
- b) Posizione supina;
- c) Decubito laterale sul lato da esaminare;
- d) **Decubito laterale su lato opposto a quello da esaminare.**

24. Test della fluttuazione della rotula:

- a) È un test per la valutazione dei legamenti alari della rotula;
- b) **È un test in grado di valutare la eventuale presenza di un versamento sotto rotuleo;**
- c) È un test in grado di valutare la eventuale presenza di un versamento sovra rotuleo;
- d) È un test in grado di valutare il grado di condropatia sotto rotulea.

25. Il principio della protesi inversa di spalla è:

- a) Compensare la carenza funzionale della cuffia dei rotatori, ottimizzando la funzione del trapezio e creando un braccio di leva;
- b) Il sovraspinoso deve essere integro per stabilizzare la protesi;
- c) Si impianta solo per contenere il dolore, non è finalizzata al recupero dei movimenti;
- d) **Compensare la carenza funzionale della cuffia dei rotatori, ottimizzando la funzione deltoidea e creando un braccio di leva.**

26. La sindrome da conflitto subacromiale o impingement subacromiale è determinata da:
- a) Restringimento dello spazio tra acromion e legamento trapezoide;
 - b) Restringimento dello spazio tra acromion e processo coracoideo;
 - c) Restringimento dello spazio tra acromion e legamento coraco-acromiale;
 - d) **Restringimento dello spazio tra acromion e testa dell'omero.**
27. La Plagiocefalia non sinostotica è:
- a) **Condizione dovuta a forze esterne che possono agire in ambito intrauterino e/o dopo la nascita, e che impediscono alle ossa craniche di crescere in modo armonico;**
 - b) Condizione dovuta a forze esterne che agiscono solo dopo la nascita, e che impediscono alle ossa craniche di crescere in modo armonico;
 - c) Condizione dovuta a forze in ambito intrauterino, e che impediscono alle ossa craniche di crescere in modo armonico;
 - d) Condizione dovuta ad un difetto di accrescimento osseo indipendente sia da forze esterne che da forze intrauterine.
28. In quale forma di piede torto congenito non è risolutiva una terapia integrata costituita da manipolazioni, apparecchi gessati e utilizzo di scarpe a biscotto?
- a) Piede equino varo addotto supinato di I grado;
 - b) Piede equino varo addotto supinato di II grado;
 - c) **Piede equino varo addotto supinato di III grado;**
 - d) Piede talo valgo.
29. A quale scopo viene utilizzato lo svincolo dei cingoli nel bambino affetto da paralisi cerebrale infantile?
- a) Sviluppare le reazioni di equilibrio;
 - b) **Ridurre l'ipertono;**
 - c) Favorire le reazioni di raddrizzamento;
 - d) Ridurre il grasping.
30. Qual è l'atteggiamento del bambino con paralisi ostetrica di tipo superiore?
- a) Abduzione, extrarotazione, estensione del gomito e pronazione dell'avambraccio;
 - b) Estensione del gomito e pronazione dell'avambraccio, mano a scimmia;
 - c) **Adduzione, intrarotazione, estensione del gomito e pronazione dell'avambraccio;**
 - d) Adduzione, intrarotazione, estensione e pronazione dell'avambraccio, deficit flessione del polso.

